



Istituto Romano di
San Michele

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERE**

MASTER 2

NON APRIRE

NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA

1) Secondo NANDA, quali sono gli elementi di una diagnosi infermieristica reale:

COD: 1_INFERMIERI.2.1

- a) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
 - b) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, eziologia
 - c) Titolo, definizione, sintomi, fattori correlati
 - d) Categoria, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
-

2) Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:

COD: 2_INFERMIERI.2.1

- a) La scala di Conley
 - b) La scala di Likert
 - c) La scala di Cheops
 - d) La scala ADL di Katz
-

3) Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento:

COD: 3_INFERMIERI.2.1

- a) L'ileo biliare
 - b) Il volvolo del tenue
 - c) L'ernia strozzata
 - d) Nessuna delle altre risposte è corretta
-

4) La talassemia è trasmessa con meccanismo:

COD: 4_INFERMIERI.2.1

- a) Autosomico recessivo
 - b) Legato al cromosoma X
 - c) Legato al cromosoma Y
 - d) Autosomico codominante
-

5) Prima di eseguire un intervento chirurgico in zone dove ci sono peli o capelli cosa si deve fare?

COD: 5_INFERMIERI.2.1

- a) Tricotomia
 - b) Disinfezione con Dechin
 - c) Lavaggio con soluzione fisiologica
 - d) Lavaggio con alcool
-

6) Quale di questi sintomi è sempre presente nell'ittero emolitico?

COD: 6_INFERMIERI.2.1

- a) Bilirubinuria
 - b) Emoglobinemia diminuita
 - c) Reticolociti aumentati
 - d) Urobilinuria
-

7) Cos'è la nocicezione?

COD: 7_INFERMIERI.2.1

- a) La ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso
 - b) La soglia minima del dolore
 - c) La manifestazione di stimoli odorosi
 - d) Un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole
-

8) Un pap-test falso negativo può essere dovuto a:

COD: 8_INFERMIERI.2.1

- a) Tutte le altre risposte sono corrette
- b) Prelievo non adeguato
- c) Fattori casuali
- d) Operatore non esperto

9) Test tubercolinico positivo. Si evince:

COD: 9_INFERMIERI.2.1

- a) Malattia da batteri gram positivi
- b) Malattia da batteri gram negativi
- c) Tutte le altre risposte sono corrette
- d) Infezione tubercolare

10) In ambito infermieristico, l'acronimo SAD indica:

COD: 10_INFERMIERI.2.1

- a) Servizio Assistenza Domiciliare
- b) Servizio Assistenza Disabili
- c) Servizio Assistenza Demenze
- d) Servizio Accoglienza Demenze

11) Per effettuare un'iniezione intramuscolare in un bambino di 10 mesi, l'infermiere sceglie la:

COD: 11_INFERMIERI.2.1

- a) Sede del vasto laterale
- b) Sede ventrogluteale
- c) Sede dorsogluteale
- d) Sede deltoidea

12) L'agopuntura e la fitoterapia possono essere esercitate:

COD: 12_INFERMIERI.2.1

- a) Solo da medici abilitati
- b) Solo da operatori abilitati con corsi professionali
- c) Anche da infermieri e ostetriche specializzati
- d) Anche da terapisti di varie categorie

13) Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile:

COD: 13_INFERMIERI.2.1

- a) Introdurre una sonda di Sengstaken - Blakemore
- b) Usare anticoagulanti
- c) Introdurre una sonda di Dormia
- d) Procedere con una fundo-plicatio secondo Nissen

14) L'omeostasi è il mantenimento:

COD: 14_INFERMIERI.2.1

- a) Dell'equilibrio biologico dell'organismo
- b) Del circolo capillare
- c) Della posizione corporea
- d) Della stazione eretta

15) Se si chiede ad un paziente "Chi è l'attuale Presidente della Repubblica", quale tipo di accertamento si sta attuando?

COD: 15_INFERMIERI.2.1

- a) Stato mentale
- b) Dati culturali
- c) Dati sensoriali
- d) Dati generali

16) Stai effettuando l'igiene intima-perineale a letto al signor G. Al termine dell'operazione ti assicuri che il prepuzio sia correttamente posizionato sul glande perché non vuoi causare:

COD: 16_INFERMIERI.2.1

- a) Edema del glande
- b) Imbarazzo della persona
- c) Difficoltà nella minzione
- d) Orchite

17) Nell'accertamento infermieristico del dolore, l'infermiere può utilizzare le seguenti scale:

COD: 17_INFERMIERI.2.1

- a) VAS, VNS, CHEOPS
- b) GCS, GPCS, AIS
- c) TINETTI, BRASS, BRISTOL
- d) BARTHEL, GOS, KATS

18) Per consentire l'identificazione precoce di una reazione trasfusionale:

COD: 18_INFERMIERI.2.1

- a) La trasfusione deve iniziare lentamente (circa 2 ml/min) e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min
- b) Occorre regolare la velocità d'infusione e monitorare la comparsa di effetti collaterali dopo 60 min
- c) La trasfusione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile (circa 20 min)
- d) La trasfusione deve iniziare ad una velocità di circa 30 ml/min e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min

19) Le parestesie sono:

COD: 19_INFERMIERI.2.1

- a) Sensazioni abnormi in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o di punture
- b) Un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa
- c) Contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causati dall'attività spontanea di una o diverse unità motorie conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale
- d) Un sintomo che esprime la difficoltà al rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria

20) Quanti stadi si riconoscono nella polmonite franca lobare non trattata?

COD: 20_INFERMIERI.2.1

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 5

21) Quali sono i componenti del sangue?

COD: 21_INFERMIERI.2.1

- a) Tutte le altre risposte sono corrette
 - b) Plasma e trombociti
 - c) Eritrociti
 - d) Leucociti
-

22) Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato?

COD: 22_INFERMIERI.2.1

- a) Ghiaccio
 - b) Impacchi caldi
 - c) Massaggio
 - d) Nessuna delle altre risposte è corretta
-

23) Le cellule prevalenti nell'infiammazione prodotta da infezioni virali sono:

COD: 23_INFERMIERI.2.1

- a) Linfociti
 - b) Eosinofili
 - c) Mastcellule
 - d) Plasmacellule
-

24) L'apoptosi è definibile come:

COD: 24_INFERMIERI.2.1

- a) Morte cellulare programmata
 - b) Morte cellulare improvvisa
 - c) Morte cellulare generalizzata
 - d) Nessuna delle altre risposte è corretta
-

25) Con il termine di omeostasi si intende:

COD: 25_INFERMIERI.2.1

- a) L'equilibrio chimico-fisico degli organismi
 - b) Lo studio delle patologie umane
 - c) La terapia postoperatoria
 - d) Lo studio della staticità biologica
-

26) In caso di presenza di corpo estraneo nelle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva generalmente:

COD: 26_INFERMIERI.2.1

- a) Ipossiemia e ipercapnia
 - b) Nessuna delle altre risposte è corretta
 - c) Iperossia
 - d) Ipertermia
-

27) La balbuzie può essere:

COD: 27_INFERMIERI.2.1

- a) Tutte le altre risposte sono corrette
 - b) Reattiva
 - c) Tonica
 - d) Clonica
-

28) Pneumotorace a valvola. Indicare la prima manovra da eseguire:

COD: 28_INFERMIERI.2.1

- a) Detendere il torace
- b) Misurare la pressione arteriosa
- c) Effettuare una lastra
- d) TC del torace

29) In caso di invaginazione colocolica si pu intervenire risolutivamente attraverso una delle seguenti manovre:

COD: 29_INFERMIERI.2.1

- a) Tutte le altre risposte sono corrette
- b) Può risolversi spontaneamente
- c) Utilizzando un clisma opaco
- d) Effettuando l'evaginazione manuale a cielo aperto

30) Nel paziente anziano si osserva prevalentemente:

COD: 30_INFERMIERI.2.1

- a) Artrosi
- b) Sindrome da immunoriconstituzione
- c) Sindrome mieloproliferativa
- d) Ittero da sindrome di Dubin-Johnson

31) Indicare a quale età emerge la positività per HIV in un lattante:

COD: 31_INFERMIERI.2.1

- a) 12-18 mesi
- b) 2-4 giorni
- c) 3-6 mesi
- d) 6-24 mesi

32) Quale delle seguenti patologie è a trasmissione diretta tra individui?

COD: 32_INFERMIERI.2.1

- a) Sifilide
- b) Peste
- c) Rabbia
- d) Malaria

33) Quando non si può somministrare un vaccino?

COD: 33_INFERMIERI.2.1

- a) Durante terapia immunosoppressiva
- b) Durante terapia antifungina
- c) Durante l'adolescenza
- d) Durante l'allattamento

34) Che cosa si intende per antisepsi?

COD: 34_INFERMIERI.2.1

- a) Disinfezione di tessuti viventi
- b) Disinfezione della sala operatoria
- c) Sterilizzazione di tessuti vegetali
- d) Sterilizzazione di strumentario chirurgico

35) Qual è la modalità corretta di detersione della ferita chirurgica?

COD: 35_INFERMIERI.2.1

- a) Procedere sempre dall'area pulita verso l'area più sporca
 - b) Procedere dall'alto verso il basso
 - c) Per convenzione si procede sempre da sinistra verso destra
 - d) Nessuna delle altre risposte è corretta
-

36) In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?

COD: 36_INFERMIERI.2.1

- a) Nei pazienti diabetici
 - b) Nei pazienti nefropatici
 - c) Nei pazienti influenzati
 - d) Nei pazienti traumatizzati
-

37) Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona impossibilitata a deglutire, l'infermiere deve:

COD: 37_INFERMIERI.2.1

- a) Chiudere il sondino per almeno mezz'ora
 - b) Nessuna delle altre alternative è corretta
 - c) Lasciare aperto il sondino
 - d) Ricollegare il raccoglitore al sondino
-

38) Quale dei seguenti articoli punisce l'esercizio abusivo della professione?

COD: 38_INFERMIERI.2.1

- a) Articolo 348 del codice penale
 - b) Articolo 2278 del codice penale
 - c) Articolo 326 del codice penale
 - d) Articolo 456 del codice penale
-

39) In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in forma scritta?

COD: 39_INFERMIERI.2.1

- a) Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue
 - b) Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue
 - c) Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso
 - d) Nessuna
-

40) Ai sensi della legge 251/2000, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche:

COD: 40_INFERMIERI.2.1

- a) Svolgono assistenza con autonomia professionale, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza
 - b) Non possono svolgere autonomamente attività dirette alla prevenzione e alla cura per la salvaguardia della salute individuale e collettiva
 - c) Svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, espletando esclusivamente le funzioni previste dai propri codici deontologici
 - d) Svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali
-

